

# Tandverzorging onder lachgas- / zuurstofsedatie

Er werd ervoor gekozen om de tandheelkundige behandeling te laten plaatsvinden onder lichte sedatie met een lachgas- / zuurstofmengsel. Lachgas- / zuurstofsedatie zorgt voor een vermindering van de angst, heeft een kalmerend effect en verbetert de medewerking.

## Vorbereiding:

- Tijdens het vooronderzoek wordt steeds gevraagd naar de gezondheidstoestand, huidige medicatie en (mogelijke) allergieën. Ook een tandheelkundige en angstvragenlijst zal worden overlopen. Op basis van de antwoorden hierop kan beoordeeld worden of er medische of andere tegenindicaties voor lachgas- / zuurstofsedatie zijn.
- De patiënt moet niet nuchter zijn voor de ingreep, nochtans gelden volgende richtlijnen: Tot 6 uur voor de ingreep mag gewoon gegeten worden. Een lichte maaltijd en het drinken van heldere dranken is toegestaan tot 2 uur voor de behandeling. Vanaf 2 uur voor de behandeling: niet meer eten.

## Behandeling:

- De behandeling wordt uitgevoerd door tandarts Tom Declercq, een gecertificeerd tandarts in lachgassedatie.
- Het lachgas- / zuurstofmengsel wordt toegediend via een neusmaskertje waarbij gezorgd wordt voor een rustige aanpak.
- Tijdens de behandeling zal de patiënt licht gesedeerd zijn, maar hij/zij blijft bewust. Op die manier proberen we om de patiënt te laten wennen aan de tandheelkundige behandeling en deze aanvaardbaar te maken. Het is de bedoeling dat de patiënt na verloop van tijd (opnieuw) kan behandeld worden aan de stoel (dus zonder lachgassedatie).
- Lokale verdoving blijft in de meeste gevallen noodzakelijk waardoor het meestal niet mogelijk is om behandelingen in verschillende delen van de mond in één enkele zittijd af te werken.
- 

## Bijkomende effecten:

- De lachgas- / zuurstofsedatie wordt over het algemeen goed verdragen.
- Bijkomende effecten kunnen zijn: lichte tintelingen en/of zwaar gevoel in armen en benen, goed gevoel (euforie), duizeligheid of slaperigheid. In uitzonderlijke gevallen kan misselijkheid optreden. Al deze neveneffecten verdwijnen meestal snel na stopzetten van de behandeling.

## Na de behandeling:

- De patiënt kan na een kwartier de praktijk verlaten, wanneer hij/zij zich weer streetfit voelt.

## Mislukken van de behandeling en mogelijke alternatieven:

- Behandeling onder lachgas- / zuurstofsedatie kan mislukken wanneer de patiënt te angstig is, te weinig medewerking vertoont of het masker niet aanvaardt.
- Wanneer de patiënt verkouden is, kan er onvoldoende door de neus geademd worden en kan de sedatie onvoldoende zijn.
- Soms is de tandheelkundige behandeling te uitgebreid of te ingrijpend voor de lachgas- / zuurstofsedatie.
- In al deze gevallen kan het nodig zijn om over te schakelen naar een algemene verdoving. Deze wordt dan uitgevoerd in de St.-Jozefskliniek in Izegem of in het Centre Hospitalier in Moeskroen.

## Kostprijs

- De kostprijs voor tandverzorging onder lachgas- / zuurstofsedatie is identiek aan de behandelingen onder gewone verdoving (volledige teruggave < 18 jaar).
- Voor de sedatie wordt een supplementair ereloon van €80/zittijd aangerekend. Dit supplementair ereloon wordt (momenteel nog) niet door het ziekenfonds terugbetaald.

We wensen u veel succes met de behandeling.

Wees ervan overtuigd dat ze met de grootste zorg en kalmte zal uitgevoerd worden.

Tandarts Tom Declercq